

Aus der chirurg. Abteilung des Krankenhauses Bamberg.
Leiter: Professor Dr. Lobenhoffer.

Beitrag zur Klinik und Chirurgie der Rückenmarkstumoren.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Armin Ziegler
aus Neunkirchen am Sand

Tag der mündlichen Prüfung: 9. Juni 1939.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1939

Referent: Geheimrat Professor Dr. Jamin.
Dekan: Professor Dr. Greving.



*Meinem Lehrer,
Herrn Professor Dr. Lobenhoffer
Bamberg*

Einteilung:

A. Literarischer Teil.

- 1) Ursache und Ausgangspunkt der Rückenmarkstumoren.
- 2) Pathologie der Rückenmarksgeschwülste.
- 3) Diagnose und Differentialdiagnose der Rückenmarkstumoren.
- 4) Therapie und postoperativer Verlauf.

B. Beschreibung eines Falles von Rückenmarkstumor.

- 1) Krankheitsercheinungen.
 - 2) Verlauf.
 - 3) Diagnose.
 - 4) Operation.
 - 5) postoperativer Verlauf.
-

Beitrag zur Klinik und Chirurgie der Rückenmarkstumoren.

Viele Krankheitserrscheinungen, die das Rückenmark in Mitleidenſchaft ziehen, äußern ſich in Formen, die wir mit dem Sammelbegriff: Kompreſionserſcheinungen bezeichnen. Wir haben es hierbei zunächſt nur mit einer Aufhebung der Leis- tungs- fähigkeit der vorhandenen, normal konfigurierten, nervöſen Ele- mente des Rückenmarks zu tun. Dieſe Kompreſion des Rückenmarks kann durch jeden Prozeß ausgelöſt werden, der den Querschnitt des knöchernen Wirbelkanals verkleinert oder auch innerhalb des Rückenmarks oder ſeiner Häute auf Koſten der nervöſen Elemente Raum beansprucht. Nach Henle (1) kommt eine Kompreſionslähmung zuſtande:

- 1) durch Erkrankungen der Wirbelſäule ſelbſt; es kommen hier vor allem Spondylitis, ſei es ſpezifischer oder unſpezifischer Art, Traumen, beſonders dislocierte Fragmente der Wirbelkörper und Wirbelbögen und Callusmaſſen beim Ausheilen von Frakturen in Frage. Den größten Anteil haben Tumoren entweder der Wirbelſäule ſelbſt oder auch in der Umgebung der Wirbelſäule entſtandene Neubildungen, die durch die foramina intervertebralia oder durch die uſurierten Wirbelkörper hindurch gegen den Wirbelkanal vordringen.
- 2) Durch Prozeſſe, die von dem Inhalt des Wirbelkanals ihren Ausgang nehmen.

Neben den Erkrankungen des Rückenmarks ſelbſt kommen hie- für viele Krankheitsformen in Betracht, die entweder von dem lockeren Bindegewebe, Fettgewebe, von der Innenfläche der Dura, vom arachnoidalen Gewebe und der Pia = intradural oder extradural ihren Ausgang nehmen. Auch hier nehmen neben den entzündlichen und degenerativen Entzündungen des Rückenmarks und ſeiner Häute, den Verletzungen, Blutungen, Abſzeſſen und Paraſiten die Tumoren den größten Raum ein.

Es soll hier unter Beschreibung eines Falles von Rückenmarkstumor auf die verschiedenen pathol. anatom. Erscheinungsformen, Diagnose, Lokalisation, Therapie und postoperativen Verlauf dieser Neubildungen näher eingegangen werden.

Rückenmarkstumoren sind echte Geschwülste, Wachstums-
exzesse von autonomem Charakter. Je nach dem Sitz des Tumors, ob innerhalb des Markes oder außerhalb, unterscheidet man intra- und extramedulläre Tumoren. Bei den letzteren ist wieder eine Unterabteilung getroffen zwischen intra- und extraduralen Geschwülsten.

Die echten medullären Blastome bestehen aus Geweben, die für die Entwicklung und den Aufbau des Rückenmarks in Frage kommen. Sie entstehen entweder aus der grauen oder weißen Substanz oder im Zentralkanal selbst und hier besonders aus den Ependymzellen. So werden sie nach Heymann (2) meist aus Glia, Ganglienzellen oder Fibrillen gebildet. Es zählen hiezu die Ganglioneurome, äußerst seltene in und am Rückenmark beobachtete Geschwulstformen.

Häufiger sind die Neubildungen des nervösen Stützgewebes, die Neurogliome. Nach Dürck (3) sind es unscharf begrenzte, aus Neurogliazellen oder Neurogliafasern entstandene Neubildungen.

Da als Mutterboden für die extramedullären Tumoren nicht das Rückenmark in Frage kommt, sondern die außerhalb des Markes gelegenen Gewebe, erklärt sich auch die Verschiedenheit der einzelnen Geschwulstarten. Bei den extramedullären Tumoren sind die wichtigsten und häufigsten die intraduralen. So fand Ranzi (4) bei 40 Fällen 14 extradurale und 26 intradurale Tumoren, Lennep (5) beschreibt 64 intradurale und 17 extradurale Tumoren. Diese Geschwulstformen können, wie schon erwähnt, ihren Ausgang nehmen vom Bindegewebe, Fettgewebe, dem Venenplexus des epiduralen Hohlraumes, der Arachnoidea, der Pia, dem Lig. denticulatum und den Nervenwurzeln. Heymann (6) zählt hiezu Lipome, Fibrome und Angiome; auch Myxofibrome, Chondrome, metastatische Carzinome und Hypernephrome sowie Sarkome werden häufiger beobachtet. Nach Henle (7) können Sarkome zu einer allgemeinen Sarkomatose der weichen Häute führen, die in 2 Formen, einerseits als mul-

multiple Entwicklung umschriebener Geschwulstknoten, andererseits als diffuse, äußerst zarte Infiltration auftreten kann. Bei den gutartigen, extramedullären Neubildungen kommen als Sitz die Gefäße, Wurzeln, Intervertebralganglien, Wirbel (Osteome, Chondrome und Fibrome) und besonders die Rückenmarkshäute in Betracht. So entwickeln sich die meisten extramed. Geschwülste aus dem Endothelbelag der Rückenmarkshäute. Diese von den Rückenmarkshäuten ausgehenden Endotheliome können sowohl von der Pia, Arachnoidea, wie von der Dura aus entstehen. Infolge ihres mesenchymalen Charakters sind sie weitgehender Rückbildung, Entartung und Umwandlung fähig; kommt es hierbei zur hyalinen Entartung und Ablagerung von Kalk, so bezeichnet man diese Tumoren als Sandgeschwülste oder Pfammome.

Zum Unterschied von den Duraendotheliomen, die sich gewöhnlich hart anfühlen, sind die arachnoidealen weich.

Eine besondere Gruppe bilden noch die sogenannten Wurzelgeschwülste, die nach den Untersuchungen Verocay's (8) aus den Schwann'schen Scheidenzellen hervorgehen und unter dem Namen Neurinome bekannt sind; so berichtet Skubiszewski (9) von einem Verocay-Neurinom, das bei einem 20-jährigen Mann in Höhe des 10. Thorakalwirbels entfernt wurde und die Erscheinungen des Brown-Séquard'schen Symptomenkomplexes verursacht hatte.

Was die Diagnose der Rückenmarksneubildungen anbelangt, so ergibt sie sich vor allem aus der eingehenden, neurologischen Untersuchung. Je nach Sitz, Gestalt und Konsistenz des Tumors können zwar im einzelnen die Symptome etwas verschieden sein, doch treten im allgemeinen ganz bestimmte, je durch das Stadium des Tumors hervorgerufene, pathologische Erscheinungen auf.

Extramedulläre Neubildungen äußern sich im ersten Stadium in einer Schädigung der Nervenwurzeln, Erscheinungen, die unter dem Namen: Wurzelsymptome bekannt sind. Je nach dem Sitz des Tumors, ob ventral oder dorsal, entstehen motorische oder sensible Reizerscheinungen; da der häufigste Sitz der Neubildungen jedoch dorsal liegt, so treten viel häufiger sensible als motorische (Paresen, Paralysen) Wurzelsymptome in Erscheinung;

so fand auch Elsberg (10) den Sitz der meisten extramedullären Tumoren an der hinteren bzw. seitlichen Rückenmarksfläche.

Die sensiblen Reizerscheinungen entstehen dadurch, daß der Tumor sich im Nerven selbst bildet oder diesen komprimiert und infiltriert.

Im Frühstadium äußern sich diese Symptome als Hyperästhesien wie Kribbeln (Barré (11), Kälte- und Wärmegefühl, doch können im weiteren Verlauf sehr heftige, neuralgiforme Schmerzen von stechendem und brennendem Charakter auftreten, die besonders bei Husten und Niesen exacerbieren. Dandy (12) erklärt diese Erscheinungen durch plötzliches Ansteigen des intracerebralen Druckes beim Husten und Niesen, dessen natürlicher Ausgleich in den Rückenmarkskanal hinein durch den Tumorblock verhindert ist; dadurch kann das Rückenmark in den durch den Tumor gebildeten Engpaß gepreßt und so die Schmerzhaftigkeit verursacht werden. Nach Heymann (13) sind diese neuralgiformen Schmerzen besonders dann als Wurzelschmerzen ansprechbar, wenn sie anfallsweise einsetzen und immer an gleicher Stelle in gleicher Intensität empfunden werden. Bei hartnäckigen Neuralgien im Arm, Gürtelschmerzen und besonders allen therapeutischen Mitteln trotztender Ischias ist daher immer an eine Rückenmarksgeschwulst zu denken. Ist eine Wurzel, sei es durch Kompression oder Infiltration durch den Tumor vollkommen zerstört, so lassen die Reizerscheinungen für eine gewisse Zeit nach, es tritt ein sogenanntes schmerzfreies Latenzstadium ein, das besonders für Tumor charakteristisch ist. Je nach der Ausdehnung des Prozesses äußert sich eine Wurzelunterbrechung als Hyp- bzw. Anaesthesie; doch tritt diese vollkommene Anaesthesie erst dann in Erscheinung, wenn mindestens 3 benachbarte Wurzeln durch den Tumor zerstört sind und auch hier herrscht nur in der mittleren Wurzel totale Anaesthesie (Bruns (14). Diese Anaesthesie tritt nach Neri (15) meist spät ein, wenn der Zeitpunkt zu einem Eingriff schon überschritten ist. Ausnahmsweise können nach Qervain (16) im Krankheitsbild neben den Neuralgien auch vasomotorische Störungen im Vordergrund stehen, sodaß die Fehldiagnose Raynaud'sche Gangrän oder Erythromelalgie gestellt wird. Besonders Fay (17) legt den vasomotorischen Störungen zur Erkennung eines Tu-

mors großen Wert bei. Die Haut unterhalb des befallenen Körperabschnittes zeige einen satinartigen Glanz, während der Abschnitt darüber mehr wie Sammt aussehe; auch bestehe in dem Gebiet der vasomotorischen Störung Hyperalgesie, während die Zone darunter für die Schmerzempfindung herabgesetzt sei; die obere Grenze der vasomotorischen Beteiligung sei auch unter Anwendung von Pilocarpin festzustellen: die Abgrenzung des spontanen oder induzierten Schwitzens zeige eine deutliche Grenze nach oben und unten im Bereich des durch den Tumor geschädigten Gebietes.

Ist der Sitz des Tumors jedoch ventral, so treten motorische Wurzelsymptome an Stelle der sensiblen. Sie äußern sich in Muskelatrophien, die jedoch vom Patienten erst bemerkt werden, wenn ein größeres Nervenbündel in Mitleidenenschaft gezogen ist, da hierbei erst eine größere Muskelgruppe Ausfallsymptome zeigt.

Eine für Rückenmarkstumor weiterhin charakteristische Erscheinung ist das Auftreten von sogenannten irradiierenden Wurzelsymptomen, den sogenannten Fernsymptomen, sensibler oder motorischer Art. Es treten hierbei Wurzelsymptome auf, die in keinerlei Verbindung mit dem betroffenen Rückenmarksteil stehen. Redlich (18) gibt als Grund hierfür Veränderungen des Liquordruckes, Zirkulationsstörungen oder durch Arachnitis serosa bedingte Krankheitsercheinungen an.

Was die Dauer dieser Wurzelsymptome betrifft, so erstreckt sich diese je nach der Wachstumsintensität und dem Ausbreitungsmodus des Tumors auf einige Wochen bis zu mehreren Jahren.

Ist einmal die Pia überschritten, so ist der Tumor in das zweite Stadium eingetreten. Es äußert sich im Auftreten von sensiblen bzw. motorischen Ausfallerscheinungen. Es tritt zunächst eine Kompression des Markes ein, ein Stadium, das jahrelang dauern kann. Todesfälle können hier auftreten, sowohl primär durch Schädigung lebenswichtiger Zentren oder auch sekundär, wie Decubitus, Cystopyelitis mit folgender Allgemeinfepsis.

Im Gegensatz zum ersten Stadium tritt bei den Marksymptomen die motorische Lähmung stärker in den Vordergrund als die sensible. Meist wird zuerst nur eine Seite betroffen mit Ausfall der Pyramidenseitenstrangbahn, sodaß die mot. Lähmung

auf derselben Seite eintritt; Reflexe wie Babinski, Oppenheim, Rossolimo und Mendel-Bechterew sind gewöhnlich positiv. Weiterhin zeigt sich infolge der Unterbrechung des Seitenstrangs eine gleichseitige vasomot. Lähmung mit stärkerer Rötung der Haut, die aber später in Cyanose übergehen kann. Als Störung der Hinterstränge und spinocerebellaren Bahnen tritt eine Beeinträchtigung der Lageempfindung, der sogenannten Tiefensensibilität in Erscheinung. Eine gleichseitige Oberflächenhyperrästhesie wird nach Bing (19) dadurch zu erklären versucht, daß nur noch der gekreuzte Seitenstrang die Berührungsempfindung zum Gehirn leitet und diese summierten Berührungsreize als Schmerz empfunden werden; kommt dazu noch eine gekreuzte Oberflächenanaesthesie, besonders für Schmerz und Temperaturempfindung, so haben wir den ausgesprochenen Symptomenkomplex der Halbseitenlähmung, der sogenannten Brown-Séquard'schen Spinallähmung, wie sie besonders für Tumoren des Hals- und Thorakalmarkes charakteristisch ist. Wächst der Tumor weiter, so zeigt sich bald das Bild der totalen Querschnittslähmung; durch Odeme, Liquorstauung oder durch Blutungen in das Mark oder den Tumor selbst kann dieser Prozeß sehr rasch eintreten und so zu vollständiger Paraplegie, ja bis zu Totalläsion führen.

Erst wenn der Tumor solche Größe erreicht hat, daß er das Cavum im Rückenmarkskanal vollkommen ausfüllt und Expansionsdruck auf die knöchernen Wirbelkörper ausübt, können Wirbelsymptome wie Steifigkeit, lokalisierte Schmerzen bei Druck auf die Dornfortsätze als diagnostische Anhaltspunkte für Rückenmarkstumor gewertet werden.

Da besonders die Differenzialdiagnose der intravertebralen Tumoren intra- und extramedullären Sitzes große Schwierigkeiten bereitet, so seien nach Bing (20) folgende Symptome für eine extramedulläre Geschwulst hervorgehoben:

- 1) Ein den Ausfallsymptomen vorausgehendes, pseudoneuralgisches Prodromalstadium (Wurzelschmerzen).
- 2) Langsame kontinuierliche Entwicklung der motorischen und sensiblen Ausfallscheinungen.
- 3) Tendenz der Motilitäts- und Sensibilitätsstörungen, hinsichtlich

ihrer Ausdehnung nach oben: das Dickenwachstum ist erheblich stärker als das Längenwachstum.

- 4) Langes Bestehen des Brown-Séquard'schen Syndroms.
- 5) Beträchtliche Intensität des spastischen Symptomenkomplexes, die auch nach dem Eintritt völliger Paraplegie weiterbesteht.
- 6) Auftreten motorischer Reizerscheinungen, wie Krämpfe, Spinalerlepilepsie.
- 7) Fehlen oder nur geringes Auftreten von degenerativen, atrophischen Lähmungen.
- 8) Fehlen von trophischen Störungen der Weichteile.
- 9) Druckempfindlichkeit der Wirbelsäule.
- 10) Anomalien des Liquor cerebrospinalis.

So kann der Liqu. cerebrospinalis zur weiteren Sicherung der Diagnose wichtige Anhaltspunkte liefern. Teilweise und besonders vollkommene Unterbrechungen des Liquorstromes im Rückenmarkskanal, wie es ja bei Rückenmarkstumor der Fall zu sein pflegt, führen zu weitgehender Veränderung der Rückenmarksflüssigkeit. Es ist der Liquordruck namentlich unterhalb der stenosierenden Stelle erhöht; besonders hoher Anfangsdruck ist auf Tumor verdächtig; gesichert wird diese Diagnose weiterhin dadurch, daß der schnell wieder abgesunkene Liquordruck auch trotz des Queckenstedt'schen Versuchs d. h. Kompression der Halsvenen zwecks Erhöhung des Liquordrucks infolge Stauung der Schädel- und Gehirnvenen, negativ ausfällt. Die Ursache besteht darin, daß der durch die Kompression erhöhte Liquordruck sich nicht über den den Stromfluß des Liquor abriegelnden Tumor ausbreiten kann. Charakteristisch ist außerdem für eine Tumorbildung, daß bei gleichzeitiger Lumbal-Cisternalpunktion der Queckenstedt'sche Versuch an der cisternalen Punktionsstelle positiv, an der lumbalen negativ ausfällt.

Was die Abweichung vom normalen, chemischen Charakter des Liquor anbelangt, so spricht besonders im Gegensatz zum farblosen, wasserklaren, gesunden Cisternenliquor eine Gelbfärbung, die Xanthochromie für Tumor. Ist außerdem die Pandy'sche Probe noch positiv, was auf erhöhten Eiweißgehalt schließen läßt und neigt der Liquor zu baldiger, namentlich gallertiger Gerinnung ohne Flocken, so kann dieses sogenannte Froin'sche Markkompressionsyndrom als beweisend für das Vorhandensein einer Neubildung am Rückenmark gelten. Auch Ehrenberg (21)

findet bei Rückenmarkstumoren im Liquor Anwesenheit von Globulin, Xanthochromie und Abwesenheit einer lympholeukocyitären Reaktion. Geringe Lymphocytose, Xanthochromie und starke Mengen Globulin sprechen nach Ehrenberg für eine partielle Obstruktion des Liquor durch den Tumor. Nach Nonne (22) genügt für die Geschwulstdiagnose allein Erhöhung des Eiweißgehaltes ohne Vermehrung der Zellen und ohne Xanthochromie im lumbalen Liquor.

Ueber den Nachweis von Tumorzellen im Liquor und damit den absoluten Beweis für eine Neubildung besteht noch große Meinungsverschiedenheit. Während nach Fischer (23) ein Vorhandensein von Tumorzellen absolut auf einen Tumor schließen läßt, so können nach Heymann (24) freie, epitheloide Zellen aus der Wand der subarachnoidalen Räume, besonders bei erhöhtem Druck, losgelöst sein und brauchen nicht unbedingt Tumorfolge zu sein; höchstens können bei der sogenannten meningealen Sarkomatose Geschwulstinseln mit der Punktionsnadel angetroffen werden.

Weiterhin kann auch der Verlauf der Mastixkurve zur Klärung der Diagnose: Tumor mitverwendet werden. Sie zeigt bei Meningealerkrankung wie Meningitiden und Tumoren ein Flockungsoptimum bei hoher Liquorverdünnung, während Organschädigungen wie Tabes dorsalis ihr Flockungsoptimum bei sehr hoher Konzentration haben.

Eine weitere, wertvolle Ergänzung der klinischen Untersuchungsmethoden ist die Myelographie. Im Gegensatz zu Pneumographie, d. h. Erkennen des Tumors nach Lufteinblasung in das Liquorsystem, hat sich die Methode des Jodipin oder des von Sicard und Forestier erfundenen Lipjodols allgemein durchgesetzt. Das Lipjodol besteht aus 4% igem Nelkenöl, das pro ccm 0,54 Jod enthält und ein gutes, relativ reizloses, röntgenologisch schattengebendes Mittel darstellt. Es werden gew. 1-2 ccm Lipjodol, das spez. schwerer als Liquor ist, in die Hinterhauptcysterne injiziert und das Herabsinken des Lipjodols sofort u. nach 4, 8, 24 und 48 Stunden kontrolliert. Da jedoch häufig kein vollkommener Verschluss durch das Hindernis vorliegt, so erfordert die genaue Beurteilung der gewonnenen Bilder eine große Erfahrung. Für die genaue Diagnose ist die Dauer der Zurück-

haltung, die Form, die das Oel am Hindernis einnimmt, maßgebend. Da intramedulläre Neubildungen selten zu einem vollkommenen Verschuß der Liquorräume führen, kommt es nach Jodipininjektionen hiebei meist nur zu einem partiellen Dauerstop. Extramedullär entstandene Neubildungen dagegen, seien es dural oder extradural gelegene Tumoren, bewirken häufiger einen vollkommenen Verschuß der Subarachnoidea und somit einen totalen Dauerstop. Als absolut charakteristisch für Rückenmarkstumor können nach Rozanow (25) nur regelmäßig geformte, dauernd verbleibende Schatten angesehen werden; auch warnt er vor allzu häufiger Anwendung der Myelographie, da bereits mehrere Todesfälle infolge Verletzung des Markes oder infolge Meningitis purulenta beschrieben seien.

Da schon kleine Tumoren, wenn auch nur einen geringen Stop hervorzurufen vermögen, so leistet die Methode der Myelographie besonders im Frühstadium des Tumors, wo die neurologischen Symptome noch nicht besonders ausgeprägt sind, für dessen Diagnose wertvolle Dienste.

Der Nachteil der Jodipininjektion besteht nur darin, daß sie zu meningealen Reizerscheinungen wie Kopfschmerzen, Wurzelschmerzen im Tumorgebiet und zu Blasen- und Mastdarmschwäche führen kann. Außerdem bleibt das Lipjodol 1½ bis 2 Jahre im Lumbalsack liegen und wirkt dadurch allein schon als Fremdkörper reizauslösend. Bruskin und Proppe (26) fanden als Folgen von Jodipininjektionen Zellveränderungen und Blutungen an Häuten, Mark und Wurzeln. Ursache dieser Veränderungen seien Jodwirkung, Ölzerfallsprodukte und mechanische Momente; diese Autoren verlangen daher exakte Anzeigestellung für die Vornahme einer Myelographie und den Versuch, das Jodipin durch Punktion zu entfernen.

Wichtig, besonders für die therapeutischen Maßnahmen ist weiterhin die topische Diagnostik der Tumoren: aus der Schädigung einzelner Gebilde innerhalb des Nervensystems und aus den beobachteten Reiz- und Ausfallerscheinungen läßt sich mit Hilfe der Segmenttabellen der Sitz der Läsion meist ziemlich genau feststellen.

Lassen aber die neurologischen Symptome im Stich, wie es besonders bei den sogenannten Fernsymptomen der Fall sein

kann, so zeigt hier die Lipjodolinjektion deutlich den Sitz des Tumors an; soll außerdem noch die Ausdehnung des Tumors caudalwärts festgestellt werden, so wird die Injektion des sogenannten Lipjodol ascendant, das spezifisch leichter als Liquor ist, empfohlen. Doch sind hierüber noch keine eingehenderen Erfolge bekannt. Außerdem läßt sich die Höhe der Kompression nach der von Förster (27) beschriebenen Methode des Zahlenerkennens ermitteln: auf der Haut der erkrankten Seite des Patienten werden Zahlen geschrieben; die Fähigkeit, die Zahlen aus dem Berührungsgefühl zu erkennen, ist bei Kompression der Hinterstränge, da dieselben ja zur Erkennung der räumlichen Momente bei Berührung dienen, auf der Haut bis zu der der Kompression entsprechenden Segmentalzone erloschen.

Bunts (28) schlägt bei geringstem Verdacht auf Rückenmarkstumor folgenden Untersuchungsweg vor:

- 1) Allgemeinzustand
- 2) neurologische Untersuchung
- 3) vollständige Blutuntersuchung (perníc. Anämie!)
- 4) Wassermann'sche Reaktion
- 5) Untersuchung der Harnwege, um evtl. psychisch oder lokal bedingte Störungen der Harnorgane auszuschalten.
- 6) Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule
- 7) Lumbalpunktion, Liquorprüfung
- 8) Myelographie.

Nach seinen Untersuchungen seien etwa die Hälfte aller Rückenmarksgeschwülste benigne, extramedulläre Tumoren mit guter Prognose, weshalb die Frühdiagnose besondere Wichtigkeit habe.

Bei differenzialdiagnostischen Erwägungen ist besonders im Stadium der Reizercheinungen an periphere Neuralgien zu denken, doch lassen die Intensität und Hartnäckigkeit der Schmerzen, das Fehlen der Druckpunkte, Steigerung der Schmerzen bei Niesen, Husten und die radiculäre Ausbreitung auf Tumor schließen. Da eine Tabes dorsalis besonders im Frühstadium ebenfalls radiculär angeordnete Beschwerden hervorrufen kann, so empfiehlt sich stets die Vornahme der Wassermann'schen Reaktion.

Bei einer Wirbeltuberkulose bestehen die Wurzelsymptome gewöhnlich nur für kürzere Zeit, außerdem schaffen die bald

auf tretenden Wirbelsymptome oder gar Abscedierungen bald Klarheit; zudem werden die Beschwerden bei Tumoren nicht wie bei Spondylitis durch Bettruhe und Gewichtszug gemindert. Besondere differenzialdiagnostische Schwierigkeiten kann die Abgrenzung gegenüber einer Pachymeningitis cervicalis hypertrophica bieten. Es können hierbei lange Zeit nur reine Wurzelsymptome bestehen, doch deutet eine konstante Steifigkeit des ergriffenen Wirbelsäulenabschnittes auf Pachymeningitis hin.

Gegenüber einer Meningitis serosa circumscripta gab vor der Erfindung der Jodipininjektion nur die Operation endgültigen Aufschluß. Heute zeigt das Röntgenbild einen für Meningitis serosa charakteristischen Jodipinstop an. Das Jodipin wird infolge der durch die Entzündung entstandenen Narbenzüge und Taschen im intraduralen Cavum auseinander gezogen und sieht wie auseinandergeprengt aus.

Gegenüber Myelitis und multipler Sklerose ist besonders auf das neuralgische Stadium zu achten; auch eine Halbseitenläsion spricht hierbei mehr für Tumor, doch kann bei diesen Erkrankungen die Differenzialdiagnose sehr schwierig sein.

Ein einmal entstandener Rückenmarkstumor pflegt meist unaufhaltsam fortzuschreiten und ist durch keinerlei medikamentöse Mittel zu beeinflussen. Er führt entweder primär durch Zerstörung lebenswichtiger Zentren oder sekundär durch Decubitus, Sepsis zum Tode. Lebensrettend, in vielen Fällen vollkommen zur Heilung führend, ist allein der chirurgische Eingriff. Sobald einmal die Diagnose: Rückenmarkstumor gestellt ist, ist mit dem operativen Eingriff nicht mehr zu zögern, da jeder gewonnene Tag von Vorteil für den Ausgang sein kann. Contraindiziert ist der Eingriff nur bei Bösartigkeit der Geschwulst (z. B. Metastasen), ungünstiger Lokalisation des Tumors und schlechtem Allgemeinzustand des Patienten.

Als Methode der Wahl hat sich heute allgemein die Laminektomie durchgesetzt. In der Regel lassen sich auch langdauernde Eingriffe am Rückenmark in örtlicher Betäubung ausführen, auch dient dieselbe hierbei zur Blutstillung, was besonders bei Eingriffen am Rückenmark von Wichtigkeit ist. Nach einem Median- oder Lappenchnitt erfolgt die Abtragung von mindestens 2 Dornfortsätzen und Wirbelbögen. Nach Entfernung des epi-

duralen Fettes liegt die Dura frei; auf exakte Blutstillung ist während des ganzen Operationsverlaufes peinlichst zu achten. Die weitere Fortsetzung der Operation ist abhängig von dem Befund. Extradurale Tumoren sind dann je nach ihrem Sitz oft leicht zu entfernen. Schwieriger gestaltet sich der Eingriff bei einer intraduralen Affektion, die meist schon durch stärkere Spannung und Vorwölbung der Dura infolge Liquoranammlung zu erkennen ist. Oft muß die Knochenwunde erweitert werden, um den Teil des Tumors zu entfernen, der jenseits der Wirbellocher liegt. Äußerst schwierig, ja häufig unmöglich ist ein weiteres Vorgehen bei ventralem oder gar intramedullärem Sitz des Tumors; zu einer restitutio ad integrum kommt es hier nur noch in den seltensten Fällen. Bei malignen Geschwülsten ist eine Exstirpation wegen des diffusen, infiltrierenden Wachstums des Tumors unmöglich; hier kann die Laminektomie lediglich zur Beseitigung der Kompressionserrscheinungen dienen. Hierbei ist die kombinierte Methode: Operation und sekundär Bestrahlung indiziert. Eine praeoperative Bestrahlung wird nach Higier (31) allgemein abgelehnt und nur postoperative und prophylaktische Röntgenapplikation empfohlen. So schlagen auch Flatau und Sawicki (29) bei allen bösartigen Gewülsten der Wirbelsäule und des Rückenmarks diese Kombination vor, auch hat, wie Buono (30) feststellt, diese Methode den Vorteil, daß die Lokalisation des Tumors einwandfrei feststeht.

Den ersten Rückenmarkstumor entfernten im Jahre 1887 Horsley und Gowers mit Erfolg. Nach einer von Stursberg (32) 1908 zusammengestellten Statistik über die operierten extra- u. intraduralen Rückenmarkstumoren wurden von 96 Fällen 49 günstig beeinflusst, d. h. 51%; davon zeigten voraussichtlich $39 = 40,6\%$ Dauerheilung; im Anschluß an die Operation starben $28 = 29,1\%$. Von Lennep (33) stellte 1920 die seit 1908 in der Literatur bekannten Fälle von operierten Rückenmarkstumoren zusammen und fand eine vollkommene Heilung von 33%, eine Besserung von 15%, keine Besserung brachte der chirurgische Eingriff bei 11%, ad exitum kamen 33%. Ranzi (34) sah nach Operation von extramedullären, intraduralen Rückenmarkstumoren bei 47% der Fälle wesentliche, bei 16% vorübergehende Besserung; bei 34% brachte die Operation keinen Erfolg. Besonders guten Erfolg zeigten nach den Arbeiten Delagenieres (35) die Operationen vor Auftreten paraplegischer Erscheinungen. Nach einge-

treterer Lähmung bilde sich eine spastische Paraplegie besser zurück als eine schlaffe.

Auch nach gelungener Operation können noch mancherlei Komplikationen den günstigen Ausgang des Eingriffs oder sogar das Leben des Patienten bedrohen. So kann eine Nachblutung die schon während der Operation den Erfolg beeinträchtigen kann, infolge Blutverlusts oder Kompression auf das Mark zu schwerem, postoperativen Schock führen. Störungen der unteren Extremitäten, Kopfschmerzen, Erbrechen, Coma werden durch eine eventuelle Nachblutung hervorgerufen (Sikard et LaPlane [36].)

Eine weitere postoperative Gefahr besteht in dem Auftreten einer Infektion. Peinlichste Alespsis ist daher die Voraussetzung für einen Eingriff am Zentralnervensystem.

So kann auch andauernder Abfluß von Cerebrospinalflüssigkeit zu Sekundärinfektion führen. Aber auch ohne diese kann stärkerer Liquorabfluß allein den Tod des Patienten herbeiführen. Nach Orth (37) pflegt bei Liquorfisteln der Tod in 25 % der Fälle einzutreten. Er empfiehlt zu rascherem Verschuß der Fistel Röntgenbestrahlung.

Eine große Gefahr für den Operierten besteht besonders noch darin, daß die Symptome nach der Operation nicht sogleich beseitigt, sondern eher etwas gesteigert werden. So können hierbei noch auftretende Lähmungen lebenswichtiger Zentren den Operationserfolg gefährden. Auch hieraus ist ersichtlich, daß die Prognose umso besser ist, in je früherem Stadium der Eingriff erfolgt. So ist nach Neri (38) schon im Stadium der Anästhesie mit keinem vollen Erfolg mehr zu rechnen. Was die Gefahr der Recidive anbelangt, so fand Bürkner (39) von den in den letzten 20 Jahren veröffentlichten Fällen von Rückenmarkstumoren nur 19 Fälle von Recidiven. Nach den Zusammenfassungen Bürkners besteht auch bei Malignität des operierten Tumors auffallend weitgehende Besserung. Es ist daher auch schon bei praeoperativ klinisch wahrscheinlich maligner Bauart des Tumors eine Operation angezeigt.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß mit der besseren Technik die Prognose bei operierten Rückenmarkstumoren sich zwar gebessert hat, doch ist ohne vorhergehende, möglichst exakte

Diagnose vor einer sogenannten Laminektomia probatoria aus den erwähnten Komplikationen noch sehr zu warnen.

Es sei nun ein Fall von Rückenmarkstumor beschrieben, der an der chirurgischen Abteilung des Städt. Krankenhauses Bamberg mit Erfolg operiert wurde.

Wie aus den einzelnen Krankenblättern zu entnehmen ist, litt der Patient F. D. (geb. 1. VII. 78) seit 1932 an einer Nervenkrankheit, deren Natur zunächst strittig war. An einer medizinischen Universitätsklinik wurde zunächst Scheitellappentumor angenommen. Anfang 1933 kam Patient an die Würzburger Beobachtungs-Station des Versorgungsamts (Prof. Dr. Knauer), wo zuerst nach Ausschluß einesluetischen Prozesses durch Blut- und Liquoranalyse, ein Prozeß im Halsmark, entweder Halsmarktumor oder cervicale Syringomyelie angenommen wurde. Die Liquorverhältnisse: starke Eiweißserhöhung und Rechtsverschiebung der Goldsol- und Mastixkurven sprachen vorwiegend für einen Tumor. Eine Myelographie wurde damals noch nicht vorgenommen. Nach einem Bericht von Prof. Dr. Magnus-Würzburg, bestanden Ende Mai 1934 bei dem Patienten folgende Symptome: Lähmung beider Beine mit stärksten Spasmen (Klonus, Bab. positiv), Fehlen der Bauchdeckenreflexe. Die Beweglichkeit der oberen Extremitäten ist beeinträchtigt, teils durch Spasmen, teils durch Atrophie der Muskeln auf der Streckseite. Die Sensibilität für alle Qualitäten ist von der Clavicula an stark herabgesetzt; außerdem besteht geringe Inkontinenz der Blase. Hirnnerven o. B. Es wird demnach eine Kompression des Rückenmarks etwa in Höhe des fünften Cervicalsegments bedingt durch einen Tumor angenommen. Die damals angefertigte Röntgenaufnahme der Halswirbelsäule zeigt einige Aufhellungen am fünften, sechsten und siebten Halswirbel, die für trophische Störungen, verursacht durch den Tumor gehalten werden.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Prof. Dr. Knauer, den Pat. im Juni 1934 aufsuchte. Prof. K. nahm ebenfalls einen extramedullären Tumor an in Höhe des 3. Halswirbels.

Am 19. 6. 1934 wurde Pat. zwecks Vornahme der Operation im hiesigen Krankenhaus in stationäre Behandlung verlegt. Bei der Aufnahme besteht eine spatische Parese beider Beine

und des linken Armes. Die rechte Hand kann etwas bewegt werden, außerdem läßt Pat. Stuhl unter sich.

Myelographie am 20. 6. 34 in Lokalanästhesie: auf den Röntgenaufnahmen fließt die eingespritzte Jodipinmenge (etwa 2 ccm) bis zur Höhe des vierten Halswirbels ohne wesentliche Verteilung des Jodipin. Von hier ab vollkommener Jodipinstop.

Bei der seitlichen Aufnahme ist der Wirbelkörper des vierten Halswirbels deutlich aufgeheilt und unscharf begrenzt.

26. 6. 34 Operation in prolongierter Evipannarkose (24 ccm) (Prof. Dr. Lobenhoffer). Rechteckiger Türflügelchnitt am Nacken mit der Basis auf der linken Seite; medianes Vordringen durch die Muskelschicht, die zum Teil scharf, zum Teil stumpf zurückpräpariert wird. Es liegen schließlich die Dornfortsätze und hinteren Bögen der Halswirbelsäule vom dritten bis sechsten Halswirbel frei, die (3. 4. 5.) abgetragen werden. Dabei zeigt sich keinerlei krankhafte Veränderung an der Knochensubstanz. Der Dura sack liegt nunmehr in einer Ausdehnung von 5—6 cm Länge frei vor. Er wird gespalten. Zwischen ihm und dem darunter liegenden Cervicalmark bestehen feine, spinnwebartige Verklebungen. Nach vorsichtigem Beiseiteschieben — auf der Medulla ist ein starkes Venengeflecht vorhanden — wird der Befund erst eindeutig klar: das Mark ist durch einen glatten, etwa pflaumenkerngroßen Tumor, der sich von vorne nach hinten zu entwickelt hat, platt gedrückt. Er sitzt in Höhe des 4. Halswirbels rechts, 1 bis 2 Wurzeln gehen in ihn hinein. Der Tumor läßt sich leicht, ohne Verletzung des Rückenmarks stumpf herausheben, da er glattwandig ist und nur einen kleinen, zarten Stil, der einige Venen enthält, aufweist. Der Dura schluß wird durch 4 Catgutnähte verschlossen; Schichtnaht der Muskulatur, Drainage, lose Hautnaht, Verband.

Der postoperative Verlauf ist aus den Krankenblatteintragungen ersichtlich:

26. 6. abends: Patient hat die Operation gut überstanden und ist heute Abend bereits wieder frisch und vollkommen klar. Es treten keine Spasmen mehr auf.

28. 6.: Patient fühlt sich rel. wohl; die Beweglichkeit in den unteren Extremitäten ist noch nicht zurückgekehrt, jedoch im Bereich der linken Hand. Beide Hände zeigen eine wesentlich bessere Durchblutung.

7. 7. 34: Entfernung der Nähte, die Wunde ist primär verheilt; der linke Arm zeigt eine wesentliche Besserung kann frei erhoben werden, auch können die Finger schon bewegt werden. Die Zunahme der Beweglichkeit schreitet von der Peripherie nach dem Schultergelenk zu täglich fort. Die Beine konnten heute zum ersten Mal im Knie angezogen werden; auch hier begann die Beweglichkeit wieder peripher, zunächst an den Zehen und im Fußgelenk.

Pat. erhält täglich Bäder und wird etwas elektrifiziert.

24. 7. 34: Dem Pat. geht es weiterhin sehr gut; die Beweglichkeit ist ausgezeichnet, Händedruck beiderseits kräftig. Pat. wird heute auf Wunsch nach Hause entlassen.

Der von Prof. Dr. M. B. Schmitt Würzburg histologisch untersuchte Tumor ergab ein Meningiom und zwar nach der histologischen Struktur ein Endotheliom ohne Psammombildung; der Tumor besteht aus drei dicht zusammenliegenden Abteilungen, deren jede eine bindegewebige Kapsel hat und zwischen ihnen eingelagert in eine Kapsel liegt eine Nervenwurzel. Im Gewebe der Kapseln sind reichlich und weite Blutgefäße, am reichlichsten in der Gegend der Nervenwurzel.

Nach einem am 15. 10. 34 von dem Pat. zwar noch diktiertem Brief an das Krankenhaus Bamberg ist weiterhin eine wesentliche Besserung eingetreten; demnach ist Gehen im Zimmer und Treppensteigen bereits mit Wärterhilfe möglich. Essen und Trinken kann allein mit der linken Hand ausgeführt werden; rechter Fuß und Hand sind noch etwas schwerfälliger im Gebrauch; vereinzelt treten noch, besonders im rechten Bein Zuckungen auf. An therapeutischen Maßnahmen erhält Pat. täglich noch kalte Waschungen, Massage und treibt täglich gymnastische Übungen.

Nach einem von dem Pat. am 30. 12. 34 eigenhändig tadellos geschriebenen Bericht kann Pat. jetzt, wenn auch noch mit Anstrengung allein gehen und sich allein ankleiden.

Eine am 27. 5. 38 eigene Untersuchung ergab folgenden Befund: Pat. gibt an, daß sich sein Zustand besonders seit dem letzten halben Jahr noch sehr gebessert habe. Alle Arbeiten des täglichen Lebens könne er vollkommen allein und mühelos ver-

richten. Er besitze zwar nicht mehr wie vor seiner Erkrankung daselbe Kraftgefühl, doch sei er mit seinem Zustand sehr zufrieden.

Untersuchungsbefund: Pat. befindet sich in sehr gutem E. und K.Z. Der Gang ist zwar noch etwas spastisch, besonders das rechte Bein wird beim Gehen noch deutlich nach vorne geschleudert, doch ist Stockhilfe nicht mehr nötig. Die inneren Organe ergeben keinen krankhaften Befund. Am Nacken, von der Spina nuchae sup. seitlich bis zum 7. Halswirbel verlaufende, völlig reizlos verheilte Operationsnarbe. Die Beweglichkeit des Halses ist weder bei Beugen, Strecken, noch Rotieren eingeschränkt und vollkommen schmerzfrei. Auch sonst sind alle Bewegungen der Extremitäten frei und ohne Einschränkung ausführbar.

Neurologisch ergab sich folgender Befund:

N. A. P. nirgends druckschmerzhaft. Pupillen rund, gleich weit, reagieren prompt auf L. und C; kein Nyktismus vorhanden. Zunge wird gerade herausgestreckt; Quosteck neg.

Radius-Periostreflex li = rechts, normal.

Tricepsreflex li = rechts normal.

Bicepsreflex li = rechts normal.

Bauchdeckenreflexe, Cremasterreflex vorhanden.

Patellarreflex rechts etwas gesteigert, li. normal, kein Klonus.

Achillessehnenreflex: beiderseits etwas gesteigert.

Rhomberg: —

Bab. re. posit., li. neg.

Oppenheim: —

Rossolimo: —

Nasen-Finger-Zeigeversuch und Knie-Haken-Versuch werden prompt ausgeführt.

Die Untersuchung auf warm und kalt ergibt überall normale Gefühlswerte.

Bei der Untersuchung auf spitz und stumpf herrscht nur noch im Bereich des rechten Unterarms geringfügige Unklarheit. Rohe Kraft und Muskeltonus überall normal.

Wenn wir nun nach einem vierjährigen, postoperativen Verlauf den Fall überblicken, so kann man mit Recht den Erfolg als sehr gut bezeichnen. Es dürfte immerhin eine Seltenheit bleiben, daß bei einem so weit fortgeschrittenen Fall von

Rückenmarkstumor, der bereits eine hochgradige Kompression des Rückenmarks mit spastischer Tetraplegie hervorgerufen hatte, eine so weitgehende Resitutio eingetreten ist. In der Literatur ließ sich kein einziger, ähnlich gelagerter Fall finden, der hiemit vergleichbar wäre. Es zeigt sich also auch bei diesem Fall, daß die Operation, selbst bei fortgeschrittenem Verlauf, — Bösartigkeit des Tumors ausgeschlossen — die einzig richtige therapeutische Methode bei jeder Lokalisation ist und unter entsprechenden Umständen von glänzendem Erfolg gekrönt ist.

Literatur-Nachweis.

- 1) Henle, Handbuch d. prakt. Chir. Band 4.
- 2) Heymann, Kirschner: Operationslehre.
- 3) Dürck, Grundriß der path. Histologie.
- 4) Ranzi, Operationen wegen Rückenmarkstumoren und ihre Resultate, Archiv für klin. Chir. Bd. CXX H 3.
- 5) Lennep. Über Rückenmarkstumoren, Inaug.-Diff. 1920.
- 6) Heymann, Kirschner, Operationslehre.
- 7) Henle, Handbuch d. pr. Chirurgie.
- 8) Verocay, Kirschner, Operationslehre.
- 9) Skubiszewski, Chir. Narz. kuchu. 3. 1930.
- 10) Elsberg, Amer. journ. of the med. sciences Mai 1930.
- 11) Barre, Presse med. no. 40. 1923. 5. 19.
- 12) Dandy, „Ein Symptom bei Rückenmarkstumoren“ Arch. of neurolog. a psych. Bd. 16, 1926.
- 13) Heymann, Kirschner: Operationslehre.
- 14) Bruns, Handbuch der prakt. Chir.
- 15) Neri, Soc. med. chir. di Bologna, 1923.
- 16) Quervain, Spez. chir. Diagnostik.
- 17) Fay, Spinal cord organ, Zentralorgan 76.
- 18) Redlich, Über Diagn. und Chir. der Rückenmarksgechwüre Med. Klinik. Jgg. 17, Nr. 44 und 45.
- 19) Bing, Gehirn- und Rückenmarksdiagnostik.
- 20) Bing, Gehirn- und Rückenmarksdiagnostik.
- 21) Ehrenberg, Hygien, Bd. XXXI. Heft 24. 1919.
- 22) Nonne, Kirschner: Chir. Bd. 3
- 23) Fischer, Beiträge zur Path. und Therap. der Rückenmarkstumoren. Z. f. d. ges. Neurol und Psych. Bd. 76, heft 1/2 s. 81. 1922.
- 24) Heymann, Kirschner: Chir.
- 25) Rozanov, Zur Frage der Myelographie, Vestn. H. 48/49.
- 26) Brunskin und Propper, Exp. Myelographie bei Hunden. Z. sovrem Chir. 4 1929.
- 27) Förster, Z. f. Chir. 20. n. 17.
- 28) Bunts, Surg. Clin. N. Amer. 15, 1047 — 1062. 1935.
- 29) Flatau und Saviki, Poskiprzegl. Bd. 2. Heft 4, 1929.
- 30) Buono, Bestrahlung der Geschw. des Rückenmarks. Fisiol. e. Med. 6. 1935.
- 31) Higier, Röntgentherapie im Bereich der Geh. und Rückenmarkstumoren. Nervenarzt. 2. 1929.
- 32) Stursberg, Handbuch der prakt. Chir. Bd. 4.
- 33) Lennep, Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. CLX. 1920.
- 34) Ranzi, Archiv f. klin. Chir. Bd. CXX Heft 3.
- 35) Delagenieres, Bemerkenswerte Operationserfolge bei Rückenmarkstumoren. Paris med. 2. 1930.
- 36) Sikard et Laplane, Soc. de Neurologie, Seanca du 6. 3. 24.
- 37) Orth, Zbl. f. Chir. 1936. f. 868.
- 38) Neri, Soc. med. chir. di Bologna 1923.
- 39) Brückner, Über rezidiv. Rückenmarkstumoren arch. f. psych. 92. 1930.

Lebenslauf.

Am 9. Juni 1911 wurde ich als Sohn der Hauptlehrerseheleute Georg und Franziska Ziegler zu Neunkirchen a. S. geboren. Nach fünfjährigem Besuch der Volksschule in Neunkirchen trat ich in das Gymnasium zu Nürnberg über, das ich Ostern 1931 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Die ersten fünf Semester bis zur ärztlichen und zahnärztlichen Vorprüfung studierte ich an der Universität Erlangen, wo ich im Jahre 1933 das Physikum bestand. Hierauf studierte ich in München, Königsberg i. Pr. Graz und dann wieder in Erlangen, wo ich im November 1936 das ärztliche Staatsexamen bestand. Im September 1937 bestand das Staatsexamen in Zahnmedizin in Erlangen. Ich war daraufhin Medizinalpraktikant in Bamberg und Nürnberg. Gegenwärtig bin ich Ass.-Arzt am Städtischen Krankenhaus Nürnberg (Strahleninstitut).

Nürnberg, den 9. Juni 1939

Dr. Armin Ziegler.
